



COLOCACION DE FEROMONAS SEGÚN MARCOS DE PLANTACION

FEROMONA ISONET. (SHINETSU)

DOSIS: 500 Difusores / ha

MARCO 4 x 4

625 Parras / ha

1 FILA COMPLETA (UN DIFUSOR POR PARRA)

1 FILA PARRA SI / PARRA NO

Dosis aprox.: 470 feromonas / ha.

El resto se colocarán en los bordes en todas las parras una feromona.

MARCO 4 x 3,5

714 Parras / ha

UNA FILA COMPLETA (UN DIFUSOR POR PARRA)

UNA FILA PARRA SI / PARRA NO

Dosis aprox.: 535 feromonas / ha.

No hace falta con esta colocación reforzar los bordes.

MARCO 4,5 x 3

740 Parras / ha

UNA FILA COMPLETA (UN DIFUSOR POR PARRA)

DOS FILAS PARRA SI / PARRA NO

Dosis aprox. : +-492 feromonas / ha.

El resto se colocarán en los bordes para refuerzo.

DISTRIBUIDORES DE:

ShinEtsu
PHEROMONES



MARCO 3,5 x 3,5

816 Parras / ha

Opción 1 :

UNA FILA COMPLETA 1 DIFUSOR/PARRA (obligatorio en la banda)

DOS FILAS PARRA SI / 2 PARRAS NO

Dosis aprox. : 450 Feromonas por hectárea

El resto se colocarán de refuerzo en el borde más expuesto.

Opción 2 :

TODAS LAS FILAS PARRA SI / PARRA NO

EXCEPTO EN LAS BANDAS QUE SERÁN 1 POR PARRA.

Dosis aprox.: 470 Feromonas / Ha

El resto se colocarán de refuerzo en el borde más expuesto.

MARCO 3,8 x 3,8

692 Parras / ha

Opción 1 :

MARCO 4 x 3

833 Parras / ha

Opción 1 :

TODAS LAS FILAS PARRA SÍ/PARRA NO

EXCEPTO LAS BANDAS QUE IRÁN 1 POR PARRA.

Dosis aprox.: 479 Feromonas por Hectárea

El resto se colocarán de refuerzo en el borde más expuesto.

Opción 2 :

UNA FILA COMPLETA (1 DIFUSOR/PARRA)

DOS FILAS PARRA SI / 2 PARRAS NO

Dosis aprox.: 462 Feromonas por hectárea

El resto se colocarán de refuerzo en el borde más expuesto.

MARCO 3 x 3

DISTRIBUIDORES DE:

ShinEtsu
PHEROMONES



1110 Parras / ha

Opción 1 :

TODAS LAS FILAS UNA FEROMONA PARRA SI / PARRA NO
Debemos de alternar la colocación de difusores para que en todas las filas
vayan colocados en diagonal. (5 de oros)
Dosis aprox. : 555 Feromonas / ha

Opción 2:

UNA FILA UNA FEROMONA PARRA SI / PARRA NO
UNA FILA PARRA SI / 2 PARRAS NO
Dosis aprox. : 462 Feromonas / ha
El resto se colocarán en el borde en todas las parras.

NOTAS:

1. Los difusores generalmente deberán colocarse al inicio de brotación de las parras, con el fin de que una vez que comiencen los vuelos del insecto haya suficiente nube feromonal en el ambiente que produzca la confusión sexual entre machos y hembras, y evitar así apareamientos.
2. En condiciones normales de clima (temperatura suave y días soleados) los vuelos comienzan 8–10 días después del inicio de brotación. En la primera semana vuelan solamente machos que son los que primero salen de las condiciones de hibernación.
3. Las feromonas se deben colocar en el uvero o brocada, dándoles media vuelta a modo de lazo, con el fin de que no se caigan.
4. No se deben colocar en los alambres con el fin de que no se produzcan rozaduras y puedan caerse.

MODO DE COLOCACIÓN



ÓPTIMO!



INCORRECTO!
Reduce la vida



ARTISTICO!
Demasiado tiempo



INCORRECTO!
Riesgo fisuras



INCORRECTO!
Riesgo fisuras, tiempo



PORQUÉ?
No es la mejor manera

DISTRIBUIDORES DE:

ShinEtsu
PHEROMONES